

কৃষি সুপারিশ

১-৪ ঠা জুন (১৭-২০ শে জৈষ্ঠ)

তিল : গাছের মাঝামাঝি অংশের ফল ভেঙ্গে দানা শক্ত হল কিনা পরীক্ষা করে ফসল কাটতে হবে।

চীনবাদাম - মাটির তলা থেকে বাদাম তুলে নিয়ে যদি দেখা যাব খোসার ভিতরের দিকে কালো ছেপ দেখা যাচ্ছে এবং দানা শক্ত হয়েছে ও দানার উপরকার খোসার লালচে রং ধরেছে, তবে বুঝতে হবে বাদাম তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে।

কু ও কলাই - বীজ বোনার দুই মাস পর থেকে শুটি তোলা হয়াপাকা শুটি সকালবেলায় ছিড়ে নেওয়া উচিত।

ভূট্টা হাইব্রোড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য কাঁচা ভূট্টার দানার মধ্যে দুধ ব্যবহার সবেমাত্র যন্ত্রণার্থে পরিনত তখন তোলার সময় হয়েছে বলে বুঝতে হবে। গীকা ভূট্টা দানার জন্য ভূট্টার আছাদন এবং ভিতরের দানা শুকিয়ে শোলে তোলা হয়। ভূট্টার দানাতে ২০-২৫% রস থাকা অবস্থায় তোলা হয়।

পাট - ভাল ফলন পেতে শোলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদ্বৰ্তে সাহায্যে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ করে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত ঢাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি কানিটারে ৫৫-৬০ টি ঢাড়া রাখা উচিত। এছাড়া আগাছা নশক ও মুখ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে। ঢাড়া বের হ্বার ২১ দিন পরে প্রথম চাপানে ৮ কেজি ও ঢাড়া বের হ্বার ৩০-৩৫ দিন পরে ২-৩ চাপানে ৮ কেজি নাইট্রোজেন একর পিছু প্রয়োগ করতে হবে।

শুরো পোকা, ঘোড়া পোকা, তামাকের ল্যাদা পোকা ও লাল ও হলুদ মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কেড়ি পোকা, শুরো পোকা, ঘোড়া পোকা, তামাকের ল্যাদা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে মনোক্রেটোফস ৩৬ এস.এল ১.৫ মিলি বা কার্বসালফন ২৫% ই.সি.২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। হলুদ মাকড়ের জন্য ডাইকোফল ১৮.৫% ই.সি. ২.৫ মিলি ও লাল মাকড়ের জন্য ফেনাজাকুইন ১০% ই.সি. ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

স্বচ্ছ সার : আমন ধান চাষে জৈবসার বেগানের জন্য স্বচ্ছসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এছন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ট্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিদ্যুপ্তি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিদ্যুপ্তি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আউস ধান-আউস ধানের বীজ বুনুন ও রোপনের জন্য বীজতোলায় বীজ ফেলুন। বগলের উপযুক্ত জাহ হীরা, প্রসাম, আমদা, তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ-৩। বীজের হার ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টেরো বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম-৭.৫% বা কার্বেন্ডারিম-৫০% গুড়ো ওয়েব ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিলামূল সার হিসাবে হেক্টের প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

বিশুরিত জানতে আপনার ইকুইপমেন্টের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিক তরুণ কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পচিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে

অমৃত পাত্র

কৃষি কৃষিঅধিকর্তা (জনসংযোগ, সম্পর্কৰণস্থিতি), পচিমবঙ্গ